

KULLANMA TALİMATI**ASİVİRAL® Krem % 5****Haricen kullanılır.****Etkin madde:** Her 1 gram krem 50 mg asiklovir içerir.**Yardımcı maddeler:** Tween 80, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, vazelin beyaz vazelin likit, propilen glikol, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **ASİVİRAL® nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **ASİVİRAL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ASİVİRAL® nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
5. **ASİVİRAL®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.**1. ASİVİRAL® nedir ve ne için kullanılır?**

ASİVİRAL® Krem, beyaz renkli ve homojen bir kremdir.
Her bir gram ASİVİRAL® Krem etkin madde olarak 50 mg asiklovir içerir.

ASİVİRAL® Krem topikal antiviral ajanlar adı verilen ve virüslerin çoğalmasını engelleyen ilaçları içeren bir gruba dahildir.

ASİVİRAL® Krem yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda tekrarlayan Herpes labialis (uçuk) tedavisinde kullanılır.

2. ASİVİRAL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ASİVİRAL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ!

Eğer:

Etkin madde asiklovir, valasiklovir veya formülasyondaki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

ASİVİRAL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ !

- Krem yalnızca deriye (kutanöz) uygulama içindir, yutulmamalıdır. Göze ağız ya da burun içine (mukozaya) ya da enfekte olmamış cilt üzerine uygulanmamalıdır. Sadece dudaklarınızın üzerinde ve ağızınızın etrafındaki uçuk yaralarında kullanınız.
- Krem uygulanan bölge, doktor önerisi haricinde, bandaj ya da sargıyla kapatılmamalıdır.
- Krem'in uygulandığı enfekte bölge üzerine, başka herhangi bir cilt ürünü (kozmetik, güneş koruyucu kremler, dudak koruyucular gibi), doktor önerisi haricinde kullanılmamalıdır.
- Krem kullanımı sırasında enfekte bölgenin iritasyonundan kaçınılmalıdır.
- Krem uygulamasını takiben duş, banyo yapmak ya da yüzmek, ilacın ciltten uzaklaşmasına neden olacağından kullanım sırasında bunlara dikkat edilmelidir.

ASİVİRAL®'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması ASİVİRAL®'in yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse ASİVİRAL® kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, ASİVİRAL® Krem'i dikkatli kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

ASİVİRAL®'in otomobil kullanma ya da dikkat ve beceri gerektiren araç kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

ASİVİRAL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASİVİRAL® Krem propilen glikol içermektedir. Propilen glikol ciltte tahriş (iritasyon) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ASİVİRAL®'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ASİVİRAL® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Tedaviye, tercihen enfeksiyonun belirtilerinin(iğnelenme şeklinde batma, kaşıntı, kızarıklık, şişkinlik gibi) ortaya çıkmasından sonra mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.

Yetişkinler ile 12 yaş ve üstü çocuklarda günde 5 defa uygulanır. Tedaviye 4 gün devam edilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

ASİVİRAL® Krem topikal yoldan uygulanır. Göze sürülmemelidir.

Asiviral® Krem kullanımından önce eller yıkanmalı ve krem kuru cilt üzerine uygulanmalıdır. Krem lezyonun görüldüğü bölgeyi tamamen örtecek şekilde, ince bir tabaka halinde sürülmelidir. Uygulanan krem görünmeyinceye kadar ilgili bölge ovulur. Enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için uygulama sırasında eldiven kullanılması önerilir. Uygulama sonrasında eller, elde kalabilecek olan kremin uzaklaştırılması için sabunla yıkanmalıdır.

• Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda yetişkinler için önerilen dozda kullanılabilir.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımı:

ASİVİRAL® Krem'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut değildir.

Eğer ASİVİRAL®'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİVİRAL® kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden fazla ASİVİRAL® kullandıysanız, cildinizde iritasyon oluşması dışında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

ASİVİRAL® kaza ile yutulduğunda ağızda iritasyona neden olabilir.

ASİVİRAL'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ASİVİRAL®'i kullanmayı unutursanız:

Eğer ASİVİRAL®'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu uygulayınız ve tedavinize daha önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

ASİVİRAL® ile tedavi sonlandırdığındaki oluşabilecek etkiler

ASİVİRAL ile tedavi sonlandırıldığında uçuğunuzun iyileşme süresinin uzaması dışında bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ASİVİRAL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ASİVİRAL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deride hafif kuruma, dökülme ve eritem, dudak kuruluğu ve dudakların çatlaması, kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASİVİRAL® 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Geçici yanma, batma ile birlikte hafif ağrı

Bunlar ASİVİRAL®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ASİVİRAL® 'İN SAKLANMASI

ASİVİRAL® 'i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ASİVİRAL®'i, 25°C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASİVİRAL®'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİVİRAL®'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Terra İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alemdağ Cad. No : 46 / 7 Üsküdar - İstanbul
Telefon: 0 216 523 77 77
Faks: 0 216 523 78 78
E-mail: info@terrailac.com.tr

Üretici: Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Kandaklar Mevkii- SAKARYA

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.